<table>
<tr><td>種名</td><td>バ　　ン<br>Gallinula chloropus<br> </td></tr>
<tr><td>分類</td><td>ツル目　クイナ科</td></tr>
<tr><td>特徴</td><td>黒い体にくちばしの赤と黄色、脇と下尾筒の白色が目立つクイナ類。全世界の温帯から熱帯にかけて広く分布する。日本には夏鳥として渡来し、関東地方以西のものは冬期も残ることが多い。狩猟鳥。</td></tr>
<tr><td>生活</td><td>湖沼、川、水田などを好み、開けた場所にもよく出てきて活動する。人影や物音に敏感で物陰に逃げ隠れするが、クイナほど警戒心は強くない。繁殖期には水辺の草やアシ原などに枯れ草を積み上げて巣を作り、5～12 個の卵を産む。雛は黒い綿羽におおわれていて、くちばしは親と同様、先が黄色くて基部が赤い。</td></tr>
<tr><td>声</td><td>昼間、水面を泳ぎながら「クルルックルルッ」とか「キュックキュック」と鳴き交わすことが多い。ディスプレーの時には「キュルクキュルクキュルク」とテンポを速めて鳴き、時々「キュッキュッ」と鳴くことがある。</td></tr>
<tr><td>見分け方</td><td>全身が黒くオオバンに似るが、額がバンでは赤いのに対してオオバンでは白いことで識別できる。バンの若鳥は脇に白い部分があることでわかる。</td></tr>
<tr><td>時期：寒地山地<br>：暖地平地</td><td>
<table>
<tr><td>(月)</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>(月)</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>その他</td><td>全長 (L) 32cm　　翼開長 (W) 52cm</td></tr>
<tr><td colspan="2">参考文献：山渓カラー名鑑　日本の野鳥</td></tr>
</table>